



# Symposium: Kontroversielle Fragen zur „Bipolaren Störung“

30.-31.05.2008

Medizinzentrum Anichstrasse 35 (MZA)  
großer Hörsaal

**A-6020 Innsbruck**



MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT  
INNSBRUCK



Österreichische Gesellschaft für  
Bipolare Erkrankungen (ÖGBE)



**BIPOLARE  
STÖRUNG**

Ich dachte, ich könnte etwas verpassen.

## Mit ZYPREXA® habe ich wieder mehr Kontrolle.

Mit Zyprexa® können Sie Ihre Patienten langfristig stabilisieren  
und wieder ins Leben zurückführen.<sup>1,2,3</sup>

In internationalen Therapie-  
richtlinien als 1. Wahl zur Pha-  
senprophylaxe empfohlen  
(CANMAT, NICE<sup>SM</sup>)

**ZYPREXA®**  
Olanzapin  
PERSPEKTIVEN FÜR DAS LEBEN

*Lilly*

### ANMELDUNG:

Fax: 0512-504-25424  
E-Mail: angelika.huemer@uki.at  
Universitätsklinik für Psychiatrie  
Tagesklinik für „Affektive Erkrankungen“  
z.H. Frau Angelika Huemer  
Innrain 43, A-6020 Innsbruck

### Tagungssekretariat:

Fr. Angelika Huemer  
Tel: 0512-504-25431 (9-11.30 Uhr)

### Tagungspräsidenz:

ao. Univ.-Prof. Dr. Armand Hausmann  
Tel: 0512-504-81620  
E-Mail: armand.hausmann@i-med.ac.at

o. Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber  
Tel. 0512-504-23631  
E-Mail: hartmann.hinterhuber@i-med.ac.at

### Wir danken den Sponsoren



Antworten, auf die es ankommt.





## 1.Tag: Freitag, 30.05.2008 (14:00-18:45)

- 14:00-14:15 Begrüßung: ao. Univ.-Prof. Dr. Armand Hausmann  
ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Simhandl  
Eröffnung: o. Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber
- Vorsitz: **o. Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber (Innsbruck)**  
**Prof. Dr. Peter Bräunig (Berlin)**
- 14:15-15:00 **PD. Dr. Andreas Erfurth / Wien**  
Medizinische Universität Wien  
Thema: Das „Bipolare Spektrum“: Kategoriale vs. dimensionale  
Betrachtungsweise: Praktischer Bezug für Diagnostik heute?
- 15:00-15:15 DISKUSSION
- 15:15-16:00 **PD. Dr. Andreas Conca / Rankweil**  
Psychiatrisches Krankenhaus Rankweil  
Thema: Bipolare Erkrankung und Komorbiditäten:  
Distinkte Nosologien oder Kontinuum?
- 16:00-16:15 DISKUSSION
- 16:15-16:45 PAUSE (Erfrischungen)
- 16:45-17:30 **Prof. Dr. Christian Simhandl / Neunkirchen**  
Krankenhaus Neunkirchen  
Thema: Brauchen wir Kombinationstherapien in der  
„Bipolaren Störung“?
- 17:30-17:45 DISKUSSION
- 17:45-18:30 **FA. Dr. Moritz Mühlbacher / Salzburg**  
Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg  
Thema: Sind Antipsychotika Alleskönner!  
Die Anwendung in der „Bipolaren Störung“
- 18:30-18:45 DISKUSSION
- 18:45 ENDE der Veranstaltung

## 2. Tag: Samstag, 31.05.2008 (8:30-12:30)

- Vorsitz: **ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Simhandl (Neunkirchen)**  
**Prof. Dr. Heinz Grunze (Newcastle/Tyne)**
- 09:00-09:45 **Prof. Dr. Heinz Grunze / Newcastle**  
School of Neurology, Neurobiology and Psychiatry  
Newcastle University  
Thema: Sind Guidelines in der Therapie der „Bipolaren  
Erkrankung“ hilfreich?
- 09:45-10:00 DISKUSSION
- 10:00-10:45 **PD. Dr. Alexandra Whitworth / Salzburg**  
Paracelsus Medizinische Universität Salzburg  
Thema: Schwangerschaft und post partum bei bipolar  
erkrankten Müttern: Eine psychopharmakologische  
Herausforderung!
- 10:45-11:00 DISKUSSION
- 11:00-11:30 PAUSE (Erfrischungen)
- 11:30-12:00 **Prof. Dr. Armand Hausmann / Innsbruck**  
Medizinische Universität Innsbruck  
Thema: Warum sollten KEINE Antidepressiva in der  
Therapie der „Bipolaren Erkrankung“ verwendet werden!
- 12:00-12:30 **Prof. Dr. Peter Bräunig / Berlin**  
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,  
Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin  
Thema: Warum sollten Antidepressiva in der Therapie der  
„Bipolaren Erkrankung“ verwendet werden!
- 12:30-13:00 DISKUSSION
- 13:00 ENDE der Veranstaltung

# Neuro- psychiatrie

Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie  
Wissenschaftliches Organ der  
pro mente austria, ÖAG, ÖGKJP, ÖSG

This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index / MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX

Themenheft  
Bipolare Erkrankungen

Konsensus-Statement  
Lewy-Körper-Demenz

21/2




Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle  
<http://www.dustri.de>



Mens sana in corpore sano

Langfristig für



Körper

Geist

**ZELDOX®**  
(Ziprasidon)

The mind and body antipsychotic

- Antipsychotisch hochwirksam in der Akut- und langfristigen Therapie<sup>1,2</sup>
- Hervorragendes metabolisches Profil\* – gewichtsneutral<sup>3,4</sup>

Wichtig für die Wirkung: Mit den Mahlzeiten einnehmen.  
Zieldosis 120-160 mg/Tag.<sup>5\*\*</sup>


1. Simpson GM, Glick ID, Weiden PJ, et al. Randomized, controlled, double-blind multicenter comparison of the efficacy and tolerability of ziprasidone and olanzapine in acutely ill inpatients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Am J Psychiatry. 2004 Oct;161(10):1837-47.  
2. Sacchetti E, Galluzzo A, Valsecchi P, et al. Comparative efficacy and safety of ziprasidone and clozapine in treatment-refractory schizophrenia: results of a randomized, double-blind, 28-week trial. Presented at the 55th American Psychiatric Association Annual Meeting, 2006 May 20-25; Toronto, Canada. 3. Allison DB, Casey DE. Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. Am J Psychiatry. 1999;156(11):1686-96. 4. Lieberman JA, Stroup ST, McEvoy JP et al. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med. 2005 Sept;353(12):1209-23. 5. Shayegan DK, Stahl SM. Atypical antipsychotics: matching receptor profile to individual patient's clinical profile. CNS Spectr. 2004 Oct;9:6-14.

\* Weight, cholesterol, glycosylated haemoglobin and triglycerides \*\* Siehe Fachinformation. Optimaler Dosisbereich. Der vollständige Dosisbereich beträgt 40-160mg/Tag.

# RECHTZEITIG!

# Risperdal Consta™

## zur Rückfallprophylaxe<sup>1</sup> Ihrer Schizophreniepatienten



\* Verwendung laut Fachinformation bei nicht beherrschbarer Negativsymptomatik oder wenn eine perorale Therapie nicht angezeigt oder zweckmäßig ist.

<sup>1</sup> Simpson GM et al.: J Clin Psychiatry, 67, 2006

**FACHKURZINFORMATION:** **Bezeichnung des Arzneimittels:** Risperdal Consta 12,5 mg, Risperdal Consta 25 mg, Risperdal Consta 37,5 mg und Risperdal Consta 50 mg - Depotpulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension. **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** Eine Durchstechflasche enthält 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg oder 50 mg Risperidon, 1 ml hergestellte Suspension enthält 6,25 mg, 12,5 mg, 18,75 mg oder 25 mg Risperidon. Risperdal Consta ist eine Mikrosphären-Formulierung zur verlängerten Freisetzung von Risperidon aus einer Matrix, bestehend aus einem Milchsäure-Glykolsäure-Kopolymer, mit einer Konzentration von 381 mg Risperidon/g Mikrosphären. **Anwendungsgebiete:** Risperdal Consta dient der Behandlung von Erkrankungen aus dem schizophrenen und schizoaffectiven Formenkreis, wie Erstmanifestationen, akute Exazerbationen und chronische Schizophrenie sowie anderer psychotischer Zustandsbilder, bei denen positive Symptome (wie Halluzinationen, Wahn und Wahnideen, Denkstörungen, Feindseligkeit, Misstrauen) und/oder negative Symptome (wie Affektverarmung, emotionale und soziale Isolation, Sprachverarmung, Depression, Schuld- und Angstgefühle) vorherrschend sind. Langzeittherapie als Rückfallprophylaxe (akute Exazerbationen) bei Patienten mit chronischer Schizophrenie. **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, Schwangerschaft und Stillzeit; Über die Anwendung von Risperidon in der Schwangerschaft liegen keine Erfahrungen vor. Daher sollten während der Schwangerschaft die Vorteile einer Behandlung gegen die Risiken sorgfältig abgewogen werden. **Stillzeit:** Es wurde gezeigt, dass Risperidon und 9-Hydroxy-Risperidone auch in die menschliche Muttermilch ausgeschieden werden. Daher sollte während der Anwendung von Risperidon nicht gestillt werden. **Wirkstoffgruppe:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Neuroleptika; ATC Code: N05AX08. **Sonstige Bestandteile:** Risperdal Consta Depot-Pulver: Milchsäure-Glykolsäure-Kopolymer (75:25), Lösungsmittel: Polysorbit 20, Carmellose-Natrium, Natriummonohydrogenphosphat Dihydrat, wasserfreie Zitronensäure, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. **Besondere Lagerungshinweise:** Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Im Kühlschrank lagern. Ist eine Kühlung unmöglich, so kann Risperdal Consta bei Temperaturen bis zu 25°C nicht länger als 7 Tage vor der Verabreichung aufbewahrt werden. Das ungekühlte Produkt darf keinen Temperaturen über 25°C ausgesetzt werden. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1232 Wien **Verschreibungspflichtig/Apothekenpflichtig:** Rp., apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen (sowie Hinweisen betreffend Gewöhnungseffekte) entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Last Update: August 2007

